

<細胞像診断試験>

- | | | | |
|------|---|------|---|
| 問 1 | 年齢 50 歳、女性
主訴または臨床所見—検診
採取方法、染色法—サイトピック、Pap. 染色
解答 ③高度異形成：HSIL | 問 14 | 年齢 57 歳、女性
主訴または臨床所見—下腹部痛
採取方法、染色法—サイトピック、Pap. 染色
解答 ④癌肉腫 |
| 問 2 | 年齢 38 歳、女性
主訴または臨床所見—不正出血
採取方法、染色法—エンドサーチ、Pap. 染色
解答 ①増殖期内膜 | 問 15 | 年齢 20 歳、女性
主訴または臨床所見—不正出血
採取方法、染色法—綿棒、Pap. 染色
解答 ②修復細胞：NILM |
| 問 3 | 年齢 30 歳、女性
主訴または臨床所見—検診
採取方法、染色法—サイトピック、Pap. 染色
解答 ①組織球：NILM | 問 16 | 年齢 55 歳、女性
主訴または臨床所見—下腹部腫瘍
採取方法、染色法—捺印、Pap. 染色
解答 ④顆粒膜細胞腫 |
| 問 4 | 年齢 73 歳、女性
主訴または臨床所見—子宮頸癌治療後
採取方法、染色法—綿棒、Pap. 染色
解答 ②放射線変化：NILM | 問 17 | 年齢 53 歳、女性
主訴または臨床所見—不正出血
採取方法、染色法—エンドサイト、Pap. 染色
解答 ④転移性癌（乳癌） |
| 問 5 | 年齢 73 歳、女性
主訴または臨床所見—下腹部腫瘍
採取方法、染色法—ソフトサイト、Pap. 染色
解答 ④明細胞癌 | 問 18 | 年齢 45 歳、女性
主訴または臨床所見—不正出血
採取方法、染色法—ソフトサイト、Pap. 染色
解答 ③子宮内膜増殖症 |
| 問 6 | 年齢 32 歳、女性
主訴または臨床所見—不正出血
採取方法、染色法—ブラシ、Pap. 染色
解答 ②カンジダ感染：NILM | 問 19 | 年齢 77 歳、女性
主訴または臨床所見—不正出血
採取方法、染色法—サイトピック、Pap. 染色
解答 ③扁平上皮癌：SCC |
| 問 7 | 年齢 78 歳、女性
主訴または臨床所見—不正出血
採取方法、染色法—綿棒、Pap. 染色
解答 ⑤悪性黒色腫 | 問 20 | 年齢 40 歳、女性
主訴または臨床所見—粘液性帯下
採取方法、染色法—ブラシ、Pap. 染色
解答 ③分葉状頸管腺過形成：AGC |
| 問 8 | 年齢 61 歳、女性
主訴または臨床所見—不正出血
採取方法、染色法—ソフトサイト、Pap. 染色
解答 ④類内膜癌（G1） | 問 21 | 年齢 75 歳、男性
主訴または臨床所見—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—喀痰、Pap. 染色
解答 ③扁平上皮癌 |
| 問 9 | 年齢 32 歳、女性
主訴または臨床所見—検診
採取方法、染色法—サイトピック、Pap. 染色
解答 ③軽度異形成：LSIL | 問 22 | 年齢 62 歳、女性
主訴または臨床所見—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色
解答 ②浸潤性粘液性腺癌 |
| 問 10 | 年齢 61 歳、女性
主訴または臨床所見—不正出血
採取方法、染色法—ブラシ、Pap. 染色
解答 ⑤腺癌：Adenocarcinoma | 問 23 | 年齢 66 歳、男性
主訴または臨床所見—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色
解答 ②扁平上皮癌 |
| 問 11 | 年齢 27 歳、女性
主訴または臨床所見—無月経
採取方法、染色法—捺印、Pap. 染色
解答 ④胞状奇胎 | 問 24 | 年齢 72 歳、男性
主訴または臨床所見—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色
解答 ⑤腺癌 |
| 問 12 | 年齢 30 歳、女性
主訴または臨床所見—検診
採取方法、染色法—ブラシ、Pap. 染色
解答 ④上皮内癌：HSIL | 問 25 | 年齢 86 歳、男性
主訴または臨床所見—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—喀痰、Pap. 染色
解答 ③中等度異型扁平上皮細胞 |
| 問 13 | 年齢 60 歳、女性
主訴または臨床所見———下腹部膨満感
採取方法、染色法———穿刺吸引、Pap. 染色 | 問 26 | 年齢 77 歳、男性
主訴または臨床所見—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色 |

- 解答 ④小細胞癌
- 問 27 年齢 39 歳、女性
主訴または臨床所見—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—腫瘍捺印、Pap. 染色
解答 ③硬化性肺胞上皮腫
- 問 28 年齢 69 歳、男性
主訴または臨床所見—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—腫瘍捺印、Pap. 染色
解答 ⑤転移性肺腫瘍（大腸癌）
- 問 29 年齢 72 歳、男性
主訴または臨床所見—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色
解答 ⑤腺癌
- 問 30 年齢 58 歳、女性
主訴または臨床所見—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—気管支洗浄液、左 Pap. 染色、右 Giemsa 染色
解答 ②クリプトコッカス症
- 問 31 年齢 68 歳、女性
主訴または臨床所見—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—腫瘍捺印、Pap. 染色
解答 ③カルチノイド腫瘍
- 問 32 年齢 73 歳、男性
主訴または臨床所見—胸部エックス線異常陰影
採取方法—喀痰、Pap. 染色
解答 ④腺癌
- 問 33 年齢 45 歳、男性
主訴または臨床所見—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色
解答 ①良性異型細胞
- 問 34 年齢 70 歳、男性
主訴または臨床所見—胆管腫瘍
採取方法、染色法—胆汁、Pap. 染色
解答 ④腺癌
- 問 35 年齢 79 歳、女性
主訴または臨床所見—大腸腫瘍
採取方法、染色法—腫瘍捺印、左 Pap. 染色、右 Giemsa 染色
解答 ⑤バーキットリンパ腫
- 問 36 年齢 68 歳、男性
主訴または臨床所見—耳下腺腫瘍
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ①正常腺房細胞
- 問 37 年齢 75 歳、男性
主訴または臨床所見—大腸腫瘍
採取方法、染色法—腫瘍捺印、Pap. 染色
解答 ④粘液癌
- 問 38 年齢 55 歳、女性
主訴または臨床所見—腭腫瘍
採取方法、染色法—超音波内視鏡下穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ④浸潤性腭管癌
- 問 39 年齢 76 歳、男性
主訴または臨床所見—胃腫瘍
採取方法、染色法—超音波内視鏡下穿刺吸引、Pap. 染色
- 解答 ⑤消化管間質腫瘍 (GIST)
- 問 40 年齢 48 歳、男性
主訴または臨床所見—口腔潰瘍
採取方法、染色法—擦過、Pap. 染色
解答 ③扁平上皮癌
- 問 41 年齢 70 歳、男性
主訴または臨床所見—腭腫瘍
採取方法、染色法—超音波内視鏡下穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ⑤浸潤性腭管癌
- 問 42 年齢 24 歳、男性
主訴または臨床所見—顎下腺腫瘍
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ⑤腺房細胞癌
- 問 43 年齢 57 歳、女性
主訴または臨床所見—胆管拡張
採取方法、染色法—胆汁、Pap. 染色
解答 ②胆道内乳頭状腫瘍
- 問 44 年齢 65 歳、女性
主訴または臨床所見—肝腫瘍
採取方法、染色法—腫瘍捺印、Pap. 染色
解答 ⑤転移性肝腫瘍（カルチノイド腫瘍）
- 問 45 年齢 49 歳、男性
主訴または臨床所見—腭腫瘍
採取方法、染色法—腫瘍捺印、Pap. 染色
解答 ④退形成癌
- 問 46 年齢 72 歳、女性
主訴または臨床所見—顎下腺腫瘍
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ②多形腺腫
- 問 47 年齢 31 歳、女性
主訴または臨床所見—乳腺腫瘍
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ②線維腺腫
- 問 48 年齢 62 歳、男性
主訴または臨床所見—仙骨部腫瘍
採取方法、染色法—腫瘍捺印、Pap. 染色
解答 ④脊索腫
- 問 49 年齢 57 歳、女性
主訴または臨床所見—甲状腺腫瘍
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ⑤髓様癌
- 問 50 年齢 52 歳、男性
主訴または臨床所見—血尿
採取方法、染色法—自然尿、Pap. 染色
解答 ④高異型度尿路上皮癌
- 問 51 年齢 62 歳、男性
主訴または臨床所見—胸水貯留
採取方法、染色法—穿刺吸引、左 Pap. 染色、右 Giemsa 染色
解答 ⑤形質細胞腫
- 問 52 年齢 54 歳、男性
主訴または臨床所見—皮膚腫瘍
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色

- 解答 ④悪性黒色腫
- 問 53 年齢 40 歳、男性
主訴または臨床所見—血尿
採取方法、染色法—自然尿、Pap. 染色
解答 ②尿路上皮細胞
- 問 54 年齢 62 歳、男性
主訴または臨床所見—頭痛
採取方法、染色法—脳脊髄液穿刺吸引、左 Pap. 染色、右 Giemsa 染色
解答 ⑤急性骨髄性白血病
- 問 55 年齢 52 歳、男性
主訴または臨床所見—脳腫瘍
採取方法、染色法—圧挫、Pap. 染色
解答 ④膠芽腫
- 問 56 年齢 53 歳、女性
主訴または臨床所見—甲状腺腫瘍
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ①橋本病
- 問 57 年齢 48 歳、女性
主訴または臨床所見—乳腺腫瘍
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ⑤粘液癌
- 問 58 年齢 61 歳、男性
主訴または臨床所見—腹水貯留
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ③腺癌
- 問 59 年齢 78 歳、男性
主訴または臨床所見—頸部リンパ節腫大
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ⑤扁平上皮癌
- 問 60 年齢 68 歳、女性
主訴または臨床所見—乳頭びらん
採取方法、染色法—擦過、Pap. 染色
解答 ⑤Paget 病