<細胞像診断試験> 問1 年齢45歳、女性 主訴または臨床所見――検診 採取方法、染色法——綿棒、Pap. 染色 解答 ①濾胞性頸管炎:NILM 問2 年齢23歳、女性 主訴または臨床所見――下腹部腫瘤 採取方法、染色法———捺印、Pap. 染色 解答 ①卵巢甲状腺腫 問3 年齢40歳、女性 主訴または臨床所見――検診 採取方法、染色法——綿棒、Pap. 染色 解答 ④高度異形成:HSIL 問4 年齢65歳、女性 主訴または臨床所見――検診 採取方法、染色法——綿棒、Pap. 染色 解答 ②萎縮性腟炎:NILM 問5 年齢40歳、女性 主訴または臨床所見――検診 採取方法、染色法---サイトピック、Pap. 染色 解答 ②エクソダス: NILM 問6 年齢47歳、女性 主訴または臨床所見――外陰部痛 採取方法、染色法――ブラシ、Pap. 染色 解答 ②ヘルペスウイルス感染 問7 年齢55歳、女性 主訴または臨床所見――不正出血 採取方法、染色法---ブラシ、Pap. 染色 解答 ②類内膜癌 (G3) 問8 年齢30歳、女性 主訴または臨床所見――黄色泡沫状帯下 採取方法、染色法---ブラシ、Pap. 染色 解答 ④トリコモナス感染: NILM 問9 年齢79歳、女性 主訴または臨床所見――子宮頸癌放射線治療後 採取方法、染色法——綿棒、Pap. 染色 解答 ③扁平上皮癌 問 10 年齢 41 歳、女性 主訴または臨床所見――検診 採取方法、染色法——ソフトサイト、Pap. 染色 解答 ③分泌期内膜 問 11 年齢 48歳、女性 主訴または臨床所見――検診 採取方法、染色法——サイトピック、Pap. 染色 解答 ④上皮内腺癌:AIS 問 12 年齢 41 歳、女性 主訴または臨床所見――検診 採取方法、染色法——サイトピック、Pap. 染色 解答 ④中等度異形成:HSIL

問 13 年齢 65 歳、女性

主訴または臨床所見――下腹部腫瘤

採取方法、染色法——穿刺吸引、左 Pap. 染色 右 Giemsa 染色

解答 ④明細胞癌 問 14 年齢 81 歳、女性 主訴または臨床所見――不正出血 採取方法、染色法---ソフトサイト、Pap. 染色 解答 ④類内膜癌(G1) 問 15 年齢 46 歳、女性 主訴または臨床所見――不正出血 採取方法、染色法——サイトピック、Pap. 染色 解答 ⑤腺癌:Adenocarcinoma 問 16 年齢 36歳、女性 主訴または臨床所見――検診 採取方法、染色法---ブラシ、Pap. 染色 解答 ③上皮内癌:HSIL 問17 年齢67歳、女性 主訴または臨床所見――下腹部腫瘤 採取方法、染色法———捺印、Pap. 染色 解答 ③ブレンナー腫瘍 問 18 年齢 44歳、女性 主訴または臨床所見――外陰部掻痒感 採取方法、染色法——綿棒、Pap. 染色 解答 ③カンジダ感染:NILM 問 19 年齢 42 歳、女性 主訴または臨床所見――不正出血 採取方法、染色法——サイトピック、Pap. 染色 解答 ④扁平上皮癌:SCC 問 20 年齢 48歳、女性 主訴または臨床所見――下腹部腫瘤 採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色 解答 ①漿液性境界悪性腫瘍 問 21 年齢 71 歳、男性 主訴または臨床所見――胸部エックス線異常陰影 採取方法、染色法———— 気管支擦過、Pap. 染色 解答 ③扁平上皮癌 問 22 年齢 65 歳、女性 主訴または臨床所見――胸部エックス線異常陰影 採取方法、染色法——腫瘤捺印、Pap. 染色 解答 ③カルチノイド腫瘍 問 23 年齢 51 歳、女性 主訴または臨床所見――胸部エックス線異常陰影 採取方法、染色法———— 気管支擦過、Pap. 染色 解答 ⑤腺癌 問 24 年齢 73 歳、男性 主訴または臨床所見――胸部エックス線異常陰影 採取方法、染色法——喀痰、Pap. 染色 解答 ④高度異型扁平上皮細胞 問 25 年齢 74歳、女性 主訴または臨床所見――血痰 採取方法、染色法——喀痰、Pap. 染色 解答 ④小細胞癌 問 26 年齢 71 歳、男性 主訴または臨床所見――胸部エックス線異常陰影

解答 ③扁平上皮癌 解答 ④神経内分泌腫瘍 問 27 年齢 70 歳、女性 問 40 年齢 40 歳、女性 主訴または臨床所見――胸部エックス線異常陰影 主訴または臨床症状――顎下腺腫脹 採取方法、染色法———気管支擦過、Pap. 染色 採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色 解答 ④浸潤性粘液性腺癌 解答 ⑤乳腺相似分泌癌 問 28 年齢 43 歳、女性 問 41 年齢 77 歳、女性 主訴または臨床所見――胸部エックス線異常陰影 主訴または臨床症状――膵管拡張 採取方法、染色法———腫瘤捺印、Pap. 染色 採取方法、染色法———膵液、Pap. 染色 解答 ③硬化性肺胞上皮腫 解答 ③膵管内乳頭粘液性腺癌(IPMC) 問 29 年齢 75 歳、男性 問 42 年齢 65 歳、男性 主訴または臨床所見――胸部エックス線異常陰影 主訴または臨床症状――閉塞性黄疸 採取方法、染色法———胆汁、Pap. 染色 解答 ⑤転移性肺腫瘍(大腸癌) 解答 ④腺癌 問 30 年齢 64 歳、男性 問 43 年齢 79 歳、女性 主訴または臨床所見――胸部エックス線異常陰影 主訴または臨床症状――口腔白色病変 採取方法、染色法———気管支擦過、Pap. 染色 採取方法、染色法——擦過、Pap. 染色 解答 ①反応性腺系異型細胞 解答 ②カンジダ症 問 31 年齢 68 歳、女性 問44 年齢45歳、女性 主訴または臨床所見――胸部エックス線異常陰影 主訴または臨床症状――腹部膨満感 採取方法、染色法———気管支擦過、Pap. 染色 採取方法、染色法——超音波内視鏡下穿刺吸引、Pap. 染色 解答 ⑤腺癌 解答 ④充実性偽乳頭狀腫瘍 (SPN) 問 32 年齢 60 歳、男性 問 45 年齢 75 歳、女性 主訴または臨床所見――血痰 主訴または臨床症状――耳下腺腫脹 採取方法、染色法———気管支擦過、Pap. 染色 採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色 解答 ③扁平上皮癌 解答 ⑤唾液腺導管癌 問 33 年齢 78 歳、男性 問 46 年齢 50 歳、女性 主訴または臨床所見――胸部エックス線異常陰影 主訴または臨床症状――膵腫瘤 採取方法、染色法———気管支擦過、Pap. 染色 採取方法、染色法——超音波内視鏡下穿刺吸引、Pap. 染色 解答 ①サイトメガロウイルス感染 解答 ②漿液性囊胞腺腫 問 34 年齢 75 歳、男性 問 47 年齢 42 歳、女性 主訴または臨床症状――閉塞性黄疸 主訴または臨床症状――偶然みつかった脳腫瘤 採取方法、染色法——内視鏡的逆行性胆道膵管造影、Pap. 染色 採取方法、染色法———腫瘤捺印、Pap. 染色 解答 ④腺癌 解答 ①髄膜腫 問 35 年齢 81 歳、男性 問 48 年齢 65 歳、男性 主訴または臨床症状――肝腫瘤 主訴または臨床症状――胸水貯留 採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色 採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色 解答 ②肝細胞癌 解答 ①反応性中皮細胞 問 36 年齢 71 歳、男性 問 49 年齢 62 歳、男性 主訴または臨床症状――耳下腺腫瘤 主訴または臨床症状――てんかん発作 採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色 採取方法、染色法———脳腫瘤捺印、Pap. 染色 解答 ③粘表皮癌 解答 ④膠芽腫 問37 年齢75歳、女性 問 50 年齢 51 歳、女性 主訴または臨床症状――膵腫瘍 主訴または臨床症状――乳腺腫瘤 採取方法、染色法——擦過、Pap. 染色 採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色 解答 ④浸潤性膵管癌 解答 ③乳管癌 問 38 年齢 65 歳、女性 問 51 年齢 75歳、男性 主訴または臨床症状――黄疸 主訴または臨床症状――血尿

採取方法、染色法———超音波内視鏡下穿刺吸引、Pap. 染色 採取方法、染色法———穿刺吸引、左: Pap. 染色 右:Giemsa 染色

採取方法、染色法———自然尿、Pap. 染色

解答 ③高異型度尿路上皮癌

主訴または臨床症状――胸水貯留

問 52 年齢 52 歳、女性

採取方法、染色法———胆汁、Pap. 染色

解答 ①良性胆管細胞

問 39 年齢 67 歳、女性

主訴または臨床症状――膵腫瘍

解答 ⑤形質細胞腫

問53 年齢61歳、女性

主訴または臨床症状――甲状腺腫瘤

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ③乳頭癌

問 54 年齢 20 歳、女性

主訴または臨床症状――乳腺腫瘤

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ②線維腺腫

問 55 年齢 68 歳、男性

主訴または臨床症状――頸部リンパ節腫大

採取方法、染色法———穿刺吸引、Giemsa 染色

解答 ②ホジキンリンパ腫

問 56 年齢 72 歳、女性

主訴または臨床症状――腹水貯留

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ③腺癌

問 57 年齢 50 歳、女性

主訴または臨床症状――大腿部腫瘤

採取方法、染色法———腫瘤圧挫、Pap. 染色

解答 ③神経鞘腫

問 58 年齢 40 歳、男性

主訴または臨床症状――血尿

採取方法、染色法———自然尿、Pap. 染色

解答 ③ウイルス感染細胞

問59 年齢60歳、女性

主訴または臨床症状――甲状腺腫瘤

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ②亜急性甲状腺炎

問 60 年齢 26 歳、男性

主訴または臨床症状――めまい

採取方法、染色法———脳脊髄液、Giemsa 染色

解答 ③急性リンパ球性白血病