

<細胞像診断試験>

問 1 年齢 50 歳、女性
主訴または臨床症状—検診
採取方法、染色法—綿棒、Pap. 染色
解答 ③高度異形成：HSIL

問 2 年齢 25 歳、女性
主訴または臨床症状—検診
採取方法、染色法—ブラシ、Pap. 染色
解答 ②分泌期内膜

問 3 年齢 60 歳、女性
主訴または臨床症状—不正出血
採取方法、染色法—サイトピック、Pap. 染色
解答 ②ヘマトキシリン結晶：NILM

問 4 年齢 71 歳、女性
主訴または臨床症状—検診
採取方法、染色法—ブラシ (LBC)、Pap. 染色
解答 ①萎縮性炎症：NILM

問 5 年齢 69 歳、女性
主訴または臨床症状—腹部膨満感
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ②漿液性腺癌

問 6 年齢 53 歳、女性
主訴または臨床症状—検診
採取方法、染色法—ブラシ、Pap. 染色
解答 ④意義不明な異型扁平上皮細胞：ASC-US

問 7 年齢 30 歳、女性
主訴または臨床症状—不正出血
採取方法、染色法—綿棒、Pap. 染色
解答 ③流産：NILM

問 8 年齢 32 歳、女性
主訴または臨床症状—検診
採取方法、染色法—ブラシ、Pap. 染色
解答 ③異型腺細胞：AGC

問 9 年齢 26 歳、女性
主訴または臨床症状—急性腹症
採取方法、染色法—捺印、Pap. 染色
解答 ①黄体嚢胞

問 10 年齢 42 歳、女性
主訴または臨床症状—不正出血
採取方法、染色法—ソフトサイト、Pap. 染色
解答 ③類内膜腺癌 (G1)

問 11 年齢 50 歳、女性
主訴または臨床症状—検診
採取方法、染色法—サイトピック、Pap. 染色
解答 ①卵管上皮化生：NILM

問 12 年齢 67 歳、女性
主訴または臨床症状—下腹部腫瘤
採取方法、染色法—捺印、Pap. 染色
解答 ②ブレンナー腫瘍

問 13 年齢 69 歳、女性
主訴または臨床症状—外陰部出血
採取方法、染色法—捺印、Pap. 染色

問 14 年齢 58 歳、女性
主訴または臨床症状—水様性帯下
採取方法、染色法—綿棒、Pap. 染色
解答 ③最小偏倚型腺癌：Adenocarcinoma

問 15 年齢 60 歳、女性
主訴または臨床症状—閉経後出血
採取方法、染色法—オネストブラシ、Pap. 染色
解答 ⑤明細胞腺癌

問 16 年齢 44 歳、女性
主訴または臨床症状—検診
採取方法、染色法—綿棒、Pap. 染色
解答 ②エクソダス：NILM

問 17 年齢 46 歳、女性
主訴または臨床症状—検診
採取方法、染色法—綿棒、Pap. 染色
解答 ④微小浸潤扁平上皮癌：SCC

問 18 年齢 21 歳、女性
主訴または臨床症状—外陰部痛
採取方法、染色法—綿棒、Pap. 染色
解答 ③ヘルペスウイルス感染

問 19 年齢 41 歳、女性
主訴または臨床症状—検診
採取方法、染色法—ソフトサイト、Pap. 染色
解答 ①増殖期内膜

問 20 年齢 51 歳、女性
主訴または臨床症状—不正出血
採取方法、染色法—サイトピック、Pap. 染色
解答 ④粘液性腺癌：Adenocarcinoma

問 21 年齢 86 歳、女性
主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—喀痰、Pap. 染色
解答 ②粘液産生性腺癌

問 22 年齢 73 歳、男性
主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色
解答 ②扁平上皮癌

問 23 年齢 64 歳、男性
主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色
解答 ④腺癌

問 24 年齢 68 歳、男性
主訴または臨床症状—咳嗽
採取方法、染色法—喀痰、Pap. 染色
解答 ③中等度異型扁平上皮細胞

問 25 年齢 43 歳、男性
主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—気管支生検捺印、左 Pap. 染色
右 Giemsa 染色
解答 ②クリプトコッカス症

問 26 年齢 59 歳、男性
主訴または臨床症状—咳嗽、発熱

	採取方法、染色法—喀痰、Pap. 染色	問 39	年齢 70 歳、女性
	解答 ①杯細胞増生		主訴または臨床症状—黄疸
問 27	年齢 67 歳、男性		採取方法、染色法—胆管擦過、Pap. 染色
	主訴または臨床症状—労作時息切れ		解答 ②腺癌
	採取方法、染色法—経気管支吸引、Pap. 染色	問 40	年齢 74 歳、男性
	解答 ④小細胞癌		主訴または臨床症状—腭頭部腫瘍
問 28	年齢 81 歳、女性		採取方法、染色法—腭液、Pap. 染色
	主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影		解答 ③腭管内乳頭粘液性腺腫（IPMA）
	採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色	問 41	年齢 83 歳、女性
	解答 ③扁平上皮癌		主訴または臨床症状—直腸腫瘍
問 29	年齢 51 歳、男性		採取方法、染色法—生検捺印、左 Pap. 染色、
	主訴または臨床症状—悪性リンパ腫治療中の肺炎		右 Giemsa 染色
	採取方法、染色法—気管支洗浄、Pap. 染色		解答 ④悪性黒色腫
	解答 ③カンジダ症	問 42	年齢 60 歳、女性
問 30	年齢 65 歳、女性		主訴または臨床症状—腭腫瘍
	主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影		採取方法、染色法—超音波内視鏡下穿刺吸引、
	採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色		Pap. 染色
	解答 ②粘液産生性腺癌		解答 ②神経内分泌腫瘍（NET）
問 31	年齢 72 歳、男性	問 43	年齢 70 歳、女性
	主訴または臨床症状—血痰		主訴または臨床症状—心窩部痛
	採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色		採取方法、染色法—胆管擦過、Pap. 染色
	解答 ③扁平上皮癌		解答 ④腺癌
問 32	年齢 70 歳、男性	問 44	年齢 56 歳、男性
	主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影		主訴または臨床症状—顎下部腫瘍
	採取方法、染色法—肺針生検捺印、Pap. 染色		採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
	解答 ⑤転移性肺癌（大腸癌）		解答 ①正常唾液腺細胞
問 33	年齢 52 歳、女性	問 45	年齢 29 歳、女性
	主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影		主訴または臨床症状—腭腫瘍
	採取方法、染色法—TBAC、Pap. 染色		採取方法、染色法—超音波内視鏡下穿刺吸引、
	解答 ②肺結核症		Pap. 染色
問 34	年齢 70 歳、男性		解答 ③Solid-pseudopapillary neoplasm
	主訴または臨床症状—腭管拡張	問 46	年齢 60 歳、男性
	採取方法、染色法—腭液、Pap. 染色		主訴または臨床症状—下痢
	解答 ⑤腺癌		採取方法、染色法—大腸生検捺印、Pap. 染色
問 35	年齢 77 歳、男性		解答 ①正常腺上皮細胞
	主訴または臨床症状—肝腫瘍	問 47	年齢 20 歳、女性
	採取方法、染色法—腫瘍捺印、Pap. 染色		主訴または臨床症状—乳腺腫瘍
	解答 ④肝細胞癌		採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
問 36	年齢 73 歳、男性		解答 ②線維腺腫
	主訴または臨床症状—口腔内潰瘍	問 48	年齢 64 歳、男性
	採取方法、染色法—擦過、Pap. 染色		主訴または臨床症状—腹水貯留
	解答 ③扁平上皮癌		採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
問 37	年齢 74 歳、男性		解答 ②腺癌
	主訴または臨床症状—耳下腺腫瘍	問 49	年齢 82 歳、男性
	採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色		主訴または臨床症状—血尿
	解答 ①ワルチン腫瘍		採取方法、染色法—自然尿、Pap. 染色
問 38	年齢 69 歳、女性		解答 ④尿路上皮癌
	主訴または臨床症状—胃腫瘍	問 50	年齢 31 歳、女性
	採取方法、染色法—超音波内視鏡下穿刺吸引、		主訴または臨床症状—甲状腺腫瘍
	Pap. 染色		採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
	解答 ③胃腸管間質性腫瘍（GIST）		解答 ①橋本病

- 問 51 年齢 14 歳、女性
主訴または臨床症状—副鼻腔腫瘍
採取方法、染色法—穿刺吸引、左 Pap. 染色
右 Giemsa 染色
解答 ②ランゲルハンス細胞組織球症
- 問 52 年齢 57 歳、女性
主訴または臨床症状—大腿部腫瘍
採取方法、染色法—腫瘍捺印、Pap. 染色
解答 ④脂肪肉腫
- 問 53 年齢 6 歳、女兒
主訴または臨床症状—第四脳室腫瘍
採取方法、染色法—腫瘍圧挫、Pap. 染色
解答 ③上衣腫
- 問 54 年齢 60 歳、女性
主訴または臨床症状—乳腺腫瘍
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ③乳管癌
- 問 55 年齢 60 歳、男性
主訴または臨床症状—腹水貯留
採取方法、染色法—術中腹水、Pap. 染色
解答 ②中皮細胞
- 問 56 年齢 51 歳、女性
主訴または臨床症状—血尿
採取方法、染色法—自然尿、Pap. 染色
解答 ①反応性尿路上皮細胞
- 問 57 年齢 59 歳、女性
主訴または臨床症状—リンパ節腫脹
採取方法、染色法—捺印、Pap. 染色
解答 ③非ホジキンリンパ腫
- 問 58 年齢 71 歳、女性
主訴または臨床症状—甲状腺腫瘍
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ③乳頭癌
- 問 59 年齢 38 歳、女性
主訴または臨床症状—乳腺腫瘍
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ②アポクリン化生細胞
- 問 60 年齢 60 歳、女性
主訴または臨床症状—両頸部リンパ節腫脹
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ②サルコイドーシス